



5
ליטר

מקס חנקן
N-P-K-S – 32-0-0-0

תכשיר מרוכז בשחרור איטי לתיקון עלוותי ובהגמעה של מחסורי חנקן

מכיל:
חנקן 32%

קרא בעיון את התווית לפני השימוש!

נער היטב את מכל התכשיר לפני השימוש!

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד!
ليس للاستعمال المنزلي - للاستعمال الزراعي فقط

מס' הייצור ותאריך ייצור מופיעים על גבי האריזה.
מיוצר ע"י חברת Agrichem - Australia
משווק ע"י צור יגאל
עדכון תווית: 10/2026

חנקן הוא רכיב התזונה העיקרי המניע צמיחה. הוא יוצר חלבונים וחומצות אמינו שמגבירים את הצמיחה והיבול. החנקן הוא אבן הבניין המרכזית של הצמח וחיוני לצמיחה. חנקן מסייע בחילוף החומרים של חומצות אמינו, ייצור הורמונים צמחיים, צמיחת תאים וייצור אנזימים. חנקן אובד לעיתים קרובות מהאדמה באמצעות שטיפה, התנדפות ופעילות מיקרוביאלית.

3 סוגי חנקן משולבים במקס חנקן:

Urea/Uric Nitrogen (Co(NH₂)₂) - 16%
Nitrate/Nitric Nitrogen (NO₃-) - 8%
Ammoniacal Nitrogen (NH₄+) - 8%

התכשיר מכיל חנקן בשחרור מבוקר כדי לספק צמיחה אחידה וצבע אחיד לאורך זמן ממושך.
מקס חנקן מסייע במניעת תנודות ברמת החנקן בצמח ותומך בהתפתחות אחידה של הצמח והפרי.

ULTRATAIN

BioYOME
With You from the Root to the Fruit

agrichem®



מקס חנקן

הוראות שימוש

אזהרות: התכשיר מסוכן בבליעה.

אמצעי זהירות ומיגון: יש ללבוש בגדי עבודה ארוכים עליהם סרבל עמיד לכימיקלים, נעלי עבודה סגורות וכובע לכיסוי ולהגנה על השיער. לבש כפפות ניטריל או PVC (לפי תקן EN-374/3). הרכב משקפי מגן עם אטימה מהצד (לפי תקן EN-166), אל תאכל או תשתה בזמן העבודה, אל תעשן בזמן העבודה. הימנע מבליעת ושאיפת התכשיר או התרסיס וממגע ישיר בעור ובעיניים.

הכנת התרסיס: מלא את מכל המרסס עד מחציתו במים. ערבב בצד את הכמות הדרושה של מקס חנקן עם כמות מעטה של מים עד קבלת תמיסה אחידה. הוסף את התמיסה שהכנת לתוך מכל המרסס תוך כדי בחישה והשלם את כמות המים החסרה. יש להמשיך להפעיל את מערכת הערבול עד תום הריסוס.

כללי: אין לרסס בתנאי מזג אויר קיצוניים כגון קרה או שרב, או כאשר הגידול נמצא בתנאי עקה כגון יובש, חום או סובל מנזקי קרה.

אופן היישום:

הגידול	ריסוס עלוותי המינון (סמ"ק/ד') או הריכוז (%)	הגמעה (סמ"ק/ד')	הערות
אבוקדו, בננה, הדסים, מנגו, פקאן	0.2-0.3%	1-2	יישום בבלבוב באביב ובמהלך גדילת הפרי, לאחר הקטיף
שקד, אפרסק, נקטרינה, דובדבן, משמש, שזיף, רימון	0.2-0.3%	1-2	אין לרסס ריסוס עלוותי במהלך עונת הגידול, יישום בפקע ורוד ולאחר קטיף לפני השלכת
תפוח, אגס	0.2-0.3%	1-2	
עגבנייה, מלפפון, פלפל, חציל, קישוא, אבטיח, מלון, תות שדה	0.2-0.4%	-	יישום 3 שבועות לאחר שתילה, המשך במרווחים של 2-3 שבועות לפי הצורך
כרוב, כרובית, ברקולי, חסה, בזיל, תבלינים	200-300	-	1. שבועיים לאחר שתילה 2. שבועיים לאחר מכן
זית	0.2-0.5%	-	1. לפני הפריחה 2. בתום הפריחה
מדשאות	200-400	-	מהאביב ועד סוף הקיץ
גפן	0.2-0.3%	1-2 (אחרי בציר)	1. כשהשריגים באורך 10 ס"מ 2. לאחר החנטה 3. לאחר הבציר
כנתונה, חיטה, תירס, חימצה	200-300	-	בעלה חמישי

שילובים: יש לבצע בדיקת בטיחות מקדימה לפני שילוב מקס חנקן בתכשירי הדברה והזנה אחרים. **בזמן הפריחה מומלץ ליישם בהגמעה**

עזרה ראשונה:

אם חדר חומר **לעיניים** - שטוף אותן בזרם מים חלש במשך 15 דקות ופנה לרופא.
במקרה של **בליעה** פנה את הנפגע לרופא והצג בפניו תווית זו.
במקרה של מגע **בעור** או בחלקי גוף חשופים יש לשטוף במים ובסבון ואחר כך במים זורמים במשך 15 דקות.

מידע לרופא:

מספר הטלפון של המרכז הארצי למידע

בהרעלות בבית חולים רמב"ם: **04-7771900**

תנאי מכירה: היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים ביעילותו, אולם היות שאין באפשרותם לפקח על אופן השימוש בתכשיר והתנאים בעת השימוש בו, אין הם אחראים לכל התוצאות והנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה.

