



חומרי הזנה

5

ליטר

מקס<sup>®</sup> אבץ

אבץ 70%, 7-0-0-0, N-P-K-S

תכשיר מרוכז לתיקון עלוותי של מחסורי אבץ,  
הגמעה ועיטוי זרעים

**מכיל:** 70% אבץ (ג'/ל')

קרא בעיון את התווית לפני השימוש!

**נער היטב את מכל התכשיר לפני השימוש!**

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד!  
ليس للاستعمال المنزلي - للاستعمال الزراعي فقط

מס' הייצור ותאריך ייצור מופיעים על גבי האריזה.  
מויצר ע"י חברת Agrichem - Australia  
משווק ע"י ביו-יום, צור יגאל  
עדכון תווית: 8/2022

אבץ מהווה חלק מאזנים המייצר פחמן דו חמצני (CO<sub>2</sub>), ושומר על רמתו עבור תהליך הפוטוסינתזה. אבץ חיוני גם לייצור אוקסין (הורמון), המסייע בוויסות הגדילה והתארכות הגבעולים. הוא משמש ליצירת הכלורופיל, הפיכת עמילנים לסוכרים ונכוחות ברקמת הצמח עוזרת לצמח לעמוד בטמפרטורות טמפרטורות קיצוניות. הניידות המוגבלת של האבץ עלולה ליצור מחסורים בצמח.

טכנולוגיית Activist<sup>®</sup> של Agrichem מספקת ספיגה מהירה של אבץ בעלים, ואחריה 4-6 שבועות של ספיגה מבוקרת. פורמולציה ייחודית המבטיחה כיסוי אחיד וספיגה יעילה בצמח.

# Activist Max

**BioYOME**  
With You from the Root to the Fruit

 agrichem<sup>®</sup>

 AUSTRALIAN MADE

## הוראות שימוש

**אזהרות:** התכשיר מסוכן בבליעה.

**אמצעי זהירות ומיגון:** יש ללבוש בגדי עבודה ארוכים עליהם סרבל עמיד לכימיקלים, נעלי עבודה סגורות וכובע לכיסוי ולהגנה על הישיר. לבש כפפות ניטריל או PVC (לפי תקן EN-374/3). הרכב משקיף מגן עם אטימה מהצד (לפי תקן EN-166), אל תאכל או תשתה בזמן העבודה, אל תעשן בזמן העבודה. הימנע מבליעת ושאיפת התכשיר או התרסיס וממגע ישיר בעור ובעיניים.

**הכנת התרסיס:** מלא את מכל המרסס עד מחציתו במים. ערבב בצד את הכמות הדרושה של מקס אבץ עם כמות מעטה של מים עד קבלת תמיסה אחידה. הוסף את התמיסה שהכנת לתוך מכל המרסס תוך כדי בחישה והשלם את כמות המים החסרה. יש להמשיך להפעיל את מערכת הערבול עד תום הריסוס.

**כללי:** אין לרסס בתנאי מזג אויר קיצוניים כגון קרה או שרב, או כאשר הגידול נמצא בתנאי עקה כגון יובש, חום או סובל מנזקי קרה.

## אופן היישום:

הגידול	ריסוס עליוותי המינון (סמ"ק/ד"ד) או הריכוז (%)	הגמעה (סמ"ק/ד"ד)	הערות
אבוקדו, בננה, הדרים, מנגו, רימון	0.05%-0.025%	100-200	יישום באביב, במהלך הגידול ולאחר קטיף
שקד, אפרסק, נקטרינה, דובדבן, משמש, שיזף	0.05%-0.025%	100-200	יישום בפסק ורוד, לאחר חנטה ולאחר קטיף לפני נשירת העלים, אין ליישם בזמן הפריחה. יישום לאחר קטיף, לפני שלכת, בריכוז 0.2%
תפוח, אגס	0.05%-0.025%	100-200	
עגבנייה, מלפפון, פלפל, חציל, קישוא, אבטיח, מלון, תות שדה	0.075%-0.025%	100-200	יישום שלושה שבועות לאחר שתילה במרווחים של 2-3 שבועות עד 14 יום לפני קטיף
כרוב, כרובית, ברוקולי, חסה, ביזל, תבלינים	25-75	100-200	ב 3-4 עלים אמיתיים
גזר, תפוז, א, בצל, סלק, בטטה	25-75	100-200	בתחילת העונה, כשיש מספיק עלווה לקלוט את התכשיר
גפן	0.075%-0.025%	100-200	1. כשהשריגים באורך 10 ס"מ 2. 5% פריחה
כותנה, חיטה, תירס, חימצה	25-200	60-200	ב 3-4 עלים אמיתיים*
פקאן	0.05-0.1%	100-200	החל משלב הניצים, כל 2-3 שבועות או בהתאם לרמת המחסור

\* מקס אבץ יכול לתקן השפעות לא רצויות של קוטלי עשבי ממשפחת הסולפונל-אוראה וקוטלי עשבים אחרים.

**שילובים:** יש לבצע בדיקת ביטחות מקדימה לפני שילוב מקס אבץ בתכשירי הדברה והזנה אחרים.

## עיטוי זרעים

הגידול	המינון ל/טון זרעים
חיטה, שעורה, כותנה	2-6

## זורה ראשונה:

אם חדר חומר לעיניים - שטוף אותן בזרם מים חלש במשך 15 דקות ופנה לרופא.  
במקרה של בליעה פנה את הנפגע לרופא והצג בפניו תוית זו.  
במקרה של מגע בעור או בחלקי גוף תשושים יש לשטוף במים ובסבון ואחר כך במים זורמים במשך 15 דקות.

## מידע לרופא:

מספר הטלפון של המרכז הארצי למידע ברעלות בבית חולים רמב"ם: **04-7771900**

**תנאי מכירה:** היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים ביעילותו, אולם היות שאין באפשרותם לפקח על אופן השימוש בתכשיר והתנאים בעת השימוש בו, אין הם אחראים לכל התוצאות והנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה, הן לפי ההוראות