

9.46
ליטר



תוסף הגנה לקוטיקולה

הקוטיקולה היא קו ההגנה הראשון של הצמח בין הסביבה לתאי האפידרמיס. היא מגנה מפני לחץ סביבתי ופיזיולוגי בשלב מוקדם של ההתפתחות באמצעות התארכות תאים כאשר פירות וירקות גדלים במהירות. חוסר בקוטיקולה מספקת יכול להשפיע לרעה על איכות הפרי ולהגביר את הפוטנציאל להפרעות פיזיולוגיות, כגון כוויות שמש וסדקים.

פארקה הוא תכשיר תחת פטנט המכיל תערובת פוספוליפידים שנועד להגן על הקוטיקולה של העלווה והפירות. שימוש בפארקה מפחית מיקרו-סדקים הגורמים להיסדקות הפרי כתוצאה מלחות וגשם. פארקה מספק הגנה פיזית באמצעות יצירת שכבה שקופה, הידרופובית ואלסטית, המפחיתה את כמות המים האובדת כתוצאה מייבוש בתקופות של טמפרטורות גבוהות ותנאי רוח חזקים.

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

BioYOME
With You from the Root to the Fruit

מס' ותאריך הייצור מופיעים על גבי האריזה
היצרן: Cultiva LLC - USA
משווק ע"י ביו יום בע"מ. הבזלת 2, צור יגאל 4486200.
טל: 072-2223280, פקס: 153-9-7905105
www.bioyome.com

cultiva

מכיל (Food grade):

Linoleic Acid- 2.00%, Oleic Acid- 0.50%, Lauric Acid- 0.20%, Phosphatidic Acid-(PA) - 0.10%, Phosphatidylethanolamine (PE) - 0.05%

הוראות שימוש:

אזהרות: מזיק בבליעה

סכנות לסביבה: אינו רעיל לדבורים

הוראות שימוש: אין לרסס כאשר הטמפרטורות עולות מעל 30 מעלות צלזיוס. מומלץ ליישם בערב. נדרש כיסוי מלא.

טבלת יישום

הגידול	מינון	הערות
דובדבן - להפחתת היסדקויות	0.5-1%	יישום ראשון עם 100% נפילת עלי כותרת, יישום שני עם שבירת הצבע. 24-48 שעות לפני אירועי גשם. יישום שלישי, במידה ונדרש, שבועיים לפני קטיף
רימון	1%	יישום ראשון לאחר חנטה. יישום שני ושלישי במרווח של 14-21 ימים. לפחות 3 יישומים בעונה
תפוח, אגס	0.5-1%	יישום ראשון לאחר חנטה. יישום שני במרווח של 14-21 ימים. בשימוש ב 0.5% אין לעבור מרווח של 14 ימים
הדרים	1%	יישום ראשון לאחר חנטה. יישום שני ושלישי במרווח של 21 ימים
אבוקדו	1%	יישום ראשון 20-30 ימים לאחר סיום פריחה, יישומים באים במרווח של 14-21 ימים. לפחות 4 יישומים בעונה
אפרסק, נקטרינה, שזיף, משמש	0.5-1%	יישום ראשון לאחר חנטה. יישום שני במרווח של 14-21 ימים. לשיפור חיי מדף רסס 3 ימים לפני קטיף
תות-שדה, אוכמניות	0.5-1%	יישום ראשון כשהפירות בגודל 5-7 מ"מ. יישום שני במרווח 7-14 ימים
גפן	0.5-1%	יישום ראשון כשהפירות בגודל 10 מ"מ. יישום שני במרווח 14-21 ימים
פלפל	0.5-1%	יישום ראשון לאחר חנטה. יישום שני במרווח של 14-21 ימים

שילובים: ניתן לשלב את פארקה עם מרבית תכשירי ההדברה והדשנים. מומלץ לבצע בדיקה מקדימה בהיקף קטן לפני יישום מסחרי. **אין ליישם בטווח של 5 ימים מיישום Captain. אין ליישם בטווח של 3 ימים מיישום גופרית. אין לשלב עם נחושת, חומצה זרחיתית, משטחים ושומנים. אין לרסס ללא בדיקה בשילוב תכשירים בפורמולציית תרכיז מתחלב.** פארקה צריך להיות התכשיר האחרון שמוסיפים למיכל הריסוס. לתוצאות מיטביות pH התמיסה צריך להיות בין 5 ל 7.

אחסון: אחסן התכשיר במקום נעול מוצל ויבש המיועד לאחסון חומרי הדברה, מחוץ ליישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. **תנאי מכירה:** היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים ביעילותו, אולם היות שאין באפשרותם לפקח על אופן השימוש בתכשיר והתנאים בעת השימוש בו, אין הם אחראים לכל התוצאות והנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה לפי כל אופן שימוש אחר.