

# סאנרד

לקידום הבשלה ושכירת צבע  
Natural Promoter of fruit  
ripening and coloring

סאנרד SUNRED סנייד

אופן היישום: בריסוס עלויות.  
מומלץ ליישם סאנרד בבוקר במזג אוויר שמש

**אזהרות:**

- מנע מגע התכשיר עם העור והעיניים.
- יש לשמור הרחק מילדים ובעלי חיים.
- הרחק מחומרם דליקים.

**אמצעי זהירות:**

- בזמן הכנת התכשיר המנע ממגע עם העיניים או העור.
- לבש חולצה סגורה עם שרוולים ארוכים ומכנסיים ארוכים, הרכב משקפי מנ, חבוש כפפות גומי ארוכות אל תאכל או שתתה בזמן העבודה
- אל תעשן בזמן העבודה

**סכנות לסביבה:**

לא ידועות או צפויות השפעות סביבתיות שליליות מכיוון שהתכשיר מכיל מרכיבים טבעיים בלבד.  
**הכנת התכשיר:** היישום בהתאם למינון שבטבלה שלהלן. יש להשתמש בתכשיר המהול תוך מספר שעות. התכשיר מיועד לשימוש עלויות. ערבב היטב לפני השימוש.

**שילובים:** הניסיון שנצבר מלמד שניתן לשלב סאנרד עם מרבית תכשירי ההדברה וההזנה, מומלץ לבצע בדיקה מקדימה כדי להימנע מפגיעה בנידול. אין לשלב סאנרד עם נחושת, שמנים מינרליים ותחליבים. השילוב עלול לגרום לפגיעה בנידול.

**בגמר השימוש:**

ניקוי ציוד הריסוס: אין צורך בפעולות מיוחדות בגמר השימוש. שטיפת הציוד במים ודטרננט

**שילוק תשטיפים:**

אין לרוקן ולהתרחץ לטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכל איסוף או מממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי מים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות המאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח הפסולת, השימוש בחומר ברמת חובב.

**הגנה אשית בגמר העבודה:** לאחר הריסוס יש להתרחץ במים וסבון, להחליף בגדים ולכבסם בנפרד מיתר הכביסה.

**מועד נכירה לשטח המטופל - ללא הגבלה.**

אחסון: לא בשמש ישירה. במיכל אטום, בטמפרטורת החדר. לא לריסוקי

5 ליטר

הגידול	מועד היישום	מינון
הדרים	כאשר 30% מהפירות החלופי צבע	1 ליטר/דונם
ענבי מאכל ויון	2 יישומים: 21 יום לפני בציר	500 סמ"ק/דונם (נפח תרסיס: 60-80 ליטר /דונם)
ענבניות ופפלי תעשייה	10 ימים לפני קטיף	800 סמ"ק/דונם
ענבניות ופפלי חממה	2 יישומים: 15 יום ו-7 ימים לפני קטיף (כאשר 30-60% מהפירות החלופי צבע)	400 סמ"ק / 100 ליטר מים
מנגו	14 ימים לפני קטיף	1 ליטר/דונם
אפרסמון	2 יישומים: 20 יום ו-10 ימים לפני קטיף (כאשר 30-60% מהפירות החלופי צבע)	400 סמ"ק / 100 ליטר מים
תפוח אפרסק	2 יישומים: 21 יום ו-14 יום לפני קטיף	500 סמ"ק/דונם
	14 ימים לפני קטיף	1 ליטר/דונם
רימון	2 יישומים: 21 יום ו-14 יום לפני קטיף	500 סמ"ק/דונם
	14 יום לפני קטיף	1 ליטר/דונם

- מחוק את הצבע.
- משפר את אחידות ההבשלה.
- מגביר את תכולת הסוכרים (Brix).
- אינו מרכז את הפרי ולכן אינו מקצר את חי המפד.
- משפרים טבעיים של תהליכי הבשלה הפועלים ישירות על ה-DNA של הפרי.
- מגביר את הצטברות הפיגמנטים על ידי אספקת פניולאלין ו-Oxylypins לתהליך הביו-סינתזה של האנצוזיאין - הפיגמנט שמקנה לפירות את צבע האדום, הכתום והסגול.
- הגברת ריכוז הסוכר: המונוסכרידים משמשים כמקור אנרגיה לחילוף החומרים בצמח.

מכיל: חנקן (N), תחמוצת אשלגן (K<sub>2</sub>O), פחמן אורגני (C), מתיונין, פניולאלין, מונוסכרידים

**דרגת רעילות -**

אינו רעיל / מספר א״ם - בלתי מסווג אינו דליק ואינו קורוזיבי

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי  
ليس للاستعمال المنزلي - للاستعمال الزراعي فقط

משוקק ע"י: ביו יום בע"מ.  
קיבוץ אייל 4584000  
טל: 072-2223290,  
פקס: 072-2223290

היצרן:

Biolchim S.p.A. - Italy

תנאי מכירה: חברת BioYome ומפיצה משוכנעים בעילותו של התכשיר סאנרד. מכיוון שאין ביכולתנו לפקח על אופן האחסון והשימוש בתכשיר ועל התנאים בעת השימוש בו, אין אנו אחראים לכל התוצאות והנזקים שעלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה, הן לפי ההוראות דלעיל והן לפי כל אופן שימוש אחר.

עזרה ראשונה: במקרה של מגע בעיניים או בעור, יש לטפוח עם מים זורמים במשך 15 דקות לפחות. במקרה של בליעה יש לפנות לטיפול רפואי.

מידע לרופא: המרכז הארצי ליעוץ רפואי והערלות. ביה"ח רמב"ם חיפה  
טל. 04-8541900

