



5
ליטר

מכיל: 50% מנגן (ג'/ל')

קרא בעיון את התווית לפני השימוש!

נער היטב את מכל התכשיר לפני השימוש!

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד!
ليس للاستعمال المنزلي - للاستعمال الزراعي فقط

מס' הייצור ותאריך ייצור מופיעים על גבי האריזה.
מיוצר ע"י חברת Agrichem - Australia
משווק ע"י בי-יוס, צור יגאל
עדכון תווית: 3/2023

מקס מנגן

מנגן N-P-K-S - 5-0-0-0 , 50%

תכשיר מרוכז לתיקון עלוותי של מחסורי מנגן,
הגמעה ועיטוי זרעים

מנגן (Mn) חיוני לצמח כמפעיל אנזימים המסייעים להטמעת חנקן. הוא מעורב בתהליך הפוטוסינתזה, ייצור הכלורופיל וחשוב בייצור ליגינין. מחסור במנגן עלול לקרות בעיקר בקרקע עם pH גבוה (אופייני לקרקע המכילה אחוז גיר גבוה) ובקרקע ספוגת מים.

טכנולוגיית SC של Agrichem מספקת ספיגה מהירה של מנגן בעלים, ואחריה 4-6 שבועות של ספיגה מבוקרת. פורמולציה ייחודית המבטיחה כיסוי אחיד וספיגה יעילה בצמח.

Maxi Mang



הוראות שימוש

אזהרות: התכשיר מסוכן בבליעה.

אמצעי זהירות ומיגון: יש לבלוש בגדי עבודה ארוכים עליהם סרבל עמיד לכימיקלים, נעלי עבודה סגורות וכובע לכיסוי ולהגנה על השיער. לבש כפפות ניטריל או PVC (לפי תקן EN-374/3). הרכב משקפי מגן עם אטימה מהצד (לפי תקן EN-166), אל תאכל או שתה בזמן העבודה, אל תעשן בזמן העבודה. הימנע מבליעת ושאיפת התכשיר או התרסיס וממגע ישיר בעור ובעיניים.

הכנת התרסיס: מלא את מכל המרסס עד מחציתו במים. ערבב בצד את הכמות הדרושה של מקס מנגן עם כמות מעטה של מים עד קבלת תמיסה אחידה. הוסף את התמיסה שהכנת לתוך מכל המרסס תוך כדי בחישה והשלם את כמות המים החסרה. יש להמשיך להפעיל את מערכת הערבול עד תום הריסוס.

כללי: אין לרסס בתנאי מזג אויר קיצוניים כגון קרה או שרב, או כאשר הגידול נמצא בתנאי עקה כגון יובש, חום או סובל מנדקי קרה.

אופן היישום:

הגידול	ריסוס עלוותי המינון (סמ"ק/ד' או הריכוז (%))	הגמעה (סמ"ק/ד')	הערות
אבוקדו, בננה, הדרים, מנגו	0.025%-0.05%	150-200	יישום באביב, במהלך הגידול ולאחר קטיף
שקד, אפרסק, נקטרינה, דובדבן, משמש, שזיף, תפוח, אגס	0.025%-0.05%	100-200	יישום בפקע ורוד ולאחר קטיף לפני נשירת העלים, אין ליישם ריסוס עלוותי בזמן צמיחת העלווה. יישום לאחר קטיף, לפני שלכת בריכוז 0.2%
	0.025%-0.05%	100-200	
עגבנייה, מלפפון, פלפל, חציל, קישוא, אבטיח, מלון, תות שדה	0.025%-0.075%	100-300	יישום שלושה שבועות לאחר שתילה במרווחים של 2-3 שבועות עד 14 יום לפני קטיף
כרוב, כרובית, ברקולי, חסה, בזיל, תבלינים	25-100	100-200	בתחילת העונה, כשיש מספיק עלווה לקלוט את התכשיר
	25-75	100-200	
גזר, תפו"א, בצל, סלק, בטטה	0.025%-0.05%	100-200	1. כשהשריגים באורך 30 ס"מ . 2. 21 יום לאחר מכן
כותנה, חיטה, תירס, חימצה	25-200	60-200	3-4 עלים

שילובים: יש לבצע בדיקת ביטחון מקדימה לפני שילוב מקס מנגן בתכשירי הדברה והזנה אחרים.

עיטוי זרעים

הגידול	המינון ל/טון זרעים
חיטה, שעורה, כותנה	2-6

עזרה ראשונה:

אם חדר חומר **לעיניים** - שטוף אותן בזרם מים חלש במשך 15 דקות ופנה לרופא.

במקרה של **בליעה** פנה את הנפגע לרופא והצג בפניו תויות זו.

במקרה של מגע **בעור** או בחלקי גוף חשופים יש לשטוף במים ובסבון ואחר כך במים זורמים במשך 15 דקות.

מידע לרופא: מספר הטלפון של המרכז הארצי למידע

בהרעלות בבית חולים רמב"ם: **04-7771900**

תנאי מכירה: היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים בעילותו, אולם היות שאין באפשרותם לפקח על אופן השימוש בתכשיר והתנאים בעת השימוש בו, אין הם אחראים לכל התוצאות והנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה, הן לפי ההוראות

