VIORMON® PLUS
ויורמון+

VIORMON PLUS

הינו ביו-סטימולנט המשמש לחיזוק ושיפור הצימוח
של הפרחים, העלים, הגבעולים והפירות.
יעיל בכל הגידולים לשיפור החנטה ולהגברת הצמיחה.

מהו Viormon Plus ?

Viormon Plus הינו מעודד צמיחה לשיפור וייצוב איכות הפרי.

- מכיל קומבינציה של מיקרו-אלמנטים וויטמינים.
- בעל פורמולציה יעילה לשיפור החנטה והצימוח ולהתפתחות איכותית של הפרי.
- משמש לחיזוק ושיפור הצימוח של הפרחים, העלים, הגבעולים והפירות.
- מכיל רכיבים המשפרים את החנטה.
- יעיל לכל שלבי ההתפתחות במהלך הגידול.

רכיבים פעילים:

0.1% - ויטמין B_3 (Nicotinic Acid).
0.1% - ויטמין B_1 (Thiamine).
2% - בורון

Viormon Plus מסייע בשיפור התהליך ההורמונלי (בדומה לחומצות ג'יברליות (GA_3), אוקסינים, ציטוקינינים) בצמחים **תחת תנאי עקה (תנאים קשים)**. לכן אנו ממליצים לשלב אותו עם מינון נמוך ככל האפשר של חומצות ג'יברליות (GA_3) או מיצוי אצות המכילים אוקסינים וציטוקינינים. צורה זו של יישום עם חומצות ג'יברליות (GA_3) או מיצוי אצות תביא לתוצאות מיטביות.

MANUFACTURER:
FARMA - CHEM SA
IN.AR. SINDOS, THESSALONIKI
P.O.Box 1026 - GREECE
www.farmachem.gr
info@farmachem.gr

FARMA - CHEM SA

כיצד מסייע הויטמין - B_1 (Thiamine)?

Thiamine הינו חומר הנוצר באופן טבעי בעלים ומשם מועבר לשורשים. שם הוא משתתף בצימוח ובפיתוח מערכת השורשים. מלבד תפקידו בפיתוח מערכת השורשים, תפקיד נוסף שלו הוא שיתוף הפעולה והסינרגיה עם ההורמונים בכלל ועם ההורמונים בשורשים בפרט. ויטמין B_1 יכול לסייע במהלך כל שלבי הגידול להתחדשות השורשים, לאחר שנפגעו כתוצאה מתנאי מליחות, פתוגנים כגון פיתיום, מחסור בחומרי הזנה, רעילות, ועוד...**אבל רק במקרה** שהעלים של הצמח לא יכולים לייצר כמות מספקת לצורך זה. מחסור באלמנטים שונים במהלך תקופות קריטיות בצימוח, כגון במהלך הפריחה, יכול לגרום לחוסר איזון ולפגיעה ביבול כולו. השימוש בויטמין B_1 מבטיח כי גם במקרה בו הצמח אינו מצליח לייצר לבדו כמות מספקת של ויטמין בתהליך טבעי על מנת לשלוח למערכת השורשים, הוא מקבל אותה ממקור חיצוני.

איפה מסייע הויטמין - B_3 (Nicotinic Acid)?

ויטמין B_3 הינו חומר המופק באופן טבעי על ידי הצמח ומסייע בחילוף החומרים ובתהליך יצירת האנרגיה.
הוא מסייע בתהליך הפעולה של למעלה מ- 50 אנזימים שונים. תחת תנאי עקה (תנאים קשים) תהליך ייצור הויטמין B_3 יכול להיפגע. הסימפטומים של המחסור בויטמין זה אינם נראים לעין, אבל הפגיעה שתגרם, כתוצאה מחוסר שלו, בתהליכי ייצור האנרגיה בשלבים הקריטיים עלולה לגרום להפסדים בלתי הפיכים ביבול. השימוש בויטמין B_3 מבטיח אספקה רציפה של אנרגיה לצורך ההתפתחות התקינה של הצמח.

תפקיד הבורון

בורון הכרחי לצורך התנועה של סוכרים בצמח וליצירה של תאים חדשים במריסטם. בנוסף הוא משפיע על הדישון והתפתחות הזרע.

למה יש צורך להשתמש Viormon Plus המכיל חומרים הנמצאים באופן טבעי בצמח?

למרות שרוב החומרים הנמצאים **Viormon Plus** הינם חומרים שהצמח יכול לייצר בעצמו באופן טבעי, זהו בדיוק סוד ההצלחה. לא מדובר בצירוף מקרי אלא בהרכב חומרים שנבחר בקפידה. כל הרכיבים והמינון המדויק שלהם **Viormon Plus** מסוגלים לתמוך בצמח ברגעים הקריטיים. התמיכה היא בהגברת הצימוח, בפריחה, בחנטה ובסופו של דבר התוצאה היא יבול איכותי.
אנחנו לא יכולים להבטיח בקלות תנאים נורמליים לייצור, אבל אנחנו יכולים לבטל את האפשרות של חוסר באותם אלמנטים קריטיים.

הוראות יישום: ריסוס עלוותי
המלצות שימוש ומינונים:
הדרים (תפוז-לימון- מנדרינה)
השתמש 4 פעמים עם 50 מ"ל/100 ליטר מים או 50 מ"ל/דונם.
יישום: 1. עם התחלת הפריחה, להגברת ושיפור החנטה. 2. אחרי החנטה, על הפירות הקטנים, לשפר את התפתחות הפירות. 3. אחרי 15 יום, לשיפור התנפחות הפרי. 4. עם תחילת ההבשלה יישום של 80 מ"ל/100 ליטר מים כאשר הפירות מתחילים להחליף צבע. עם הטיפול האחרון אנחנו מכוונים לשיפור הצבע, חיזוק הבריקס והארכת חיי המדף לאחר קטיף.

זית
השתמש 5 פעמים עם 50 מ"ל/100 ליטר מים או 50 מ"ל לדונם.
יישום: 1. עם היווצרות התפרחת להגברת ושיפור החנטה. 2. בפריחה מלאה, למנוע נשירת פירות. 3. אחרי החנטה, על הפירות הקטנים, להתפתחות הפירות(drupe). 4. אחרי 15 יום (אופציונאלי), לשפר את התפתחות הפירות. 5. עם תחילת ההבשלה (אופציונאלי), כאשר הפירות מתחילים להחליף צבע. שלושת הטיפולים הראשונים הם החשובים ביותר.

פירות גלעיניים (אפרסק – משמש)
השתמש 5 פעמים עם 50 מ"ל/100 ליטר מים או 50 מ"ל לדונם.
יישום: 1. עם התחלת הפריחה, להגברת ושיפור החנטה ועל מנת למנוע נזקי קרה מאוחרת. 2. בפריחה מלאה להצלחת החנטה ולהגנה על הפרחים מקרה מאוחרת. 3. אחרי החנטה, על הפירות הקטנים, לשפר את התפתחות הפירות. 4. אחרי 15 יום, לשיפור התנפחות הפרי. 5. עם תחילת ההבשלה, כאשר הפירות מתחילים להחליף צבע, על מנת לקבל הבשלה אחידה, לחזק את הצבע והבריקס ולהאריך את חיי המדף לאחר קטיף.

דובדבן
השתמש 5 פעמים עם 60-50 מ"ל/100 ליטר מים או 60-50 מ"ל לדונם.יישום: 1. עם התנפחות הניצנים למניעת נזקי קרה מאוחרת (אופציונאלי). 2. עם התחלת הפריחה כאשר 5% מהפרחים פתוחים על מנת לשפר את החנטה ולהגן על הפרחים מקרה מאוחרת. 3. בפריחה מלאה לחנטה מוצלחת וחיזוק הגבעול. 4. אחרי החנטה, על הפירות הקטנים (3 מ"מ), לשפר את התפתחות הפירות. 5. עם תחילת ההבשלה, כאשר הפירות מתחילים להחליף צבע, על מנת לקבל הבשלה אחידה, לחזק את הצבע והבריקס ולהאריך את חיי המדף לאחר קטיף.

פירות גרעיניים (תפוח – אגס)
השתמש 5 פעמים עם 50 מ"ל/100 ליטר מים או 50 מ"ל לדונם.
יישום: 1. עם התנפחות הניצנים (קצה עליון ורוד) למניעת נזקי קרה מאוחרת. 2. בפריחה (כאשר הפרח המוביל נפתח באשכול הניצנים), לחנטה מוצלחת. 3. אחרי החנטה, על הפירות הקטנים, לשפר את התפתחות הפירות. 4. אחרי 15 יום, לשיפור התנפחות הפירות וספיגת הסידן. 5. עם תחילת ההבשלה, כאשר הפירות מתחילים להחליף צבע, על מנת לקבל הבשלה אחידה, לחזק את הצבע והבריקס ולהאריך את חיי המדף לאחר קטיף.

כרם
לענבי יין
השתמש 4 פעמים עם 50 מ"ל/100 ליטר מים או 50 מ"ל/דונם.
יישום: 1. עם הצימוח החדש כאשר השריגים באורך של 5-10 ס"מ. באמצעות יישום זה אנחנו מקבלים צימוח אחיד ומוקדם יותר וכרם חזק ומוכן יותר לתקופת הפריחה. 2. עם התחלת הפריחה כאשר 2-3% מהפרחים פתוחים או בפריחה מלאה. בשלב זה, היישום מחזק את הפרח לקראת ההאבקה. 3. אחרי החנטה כאשר גודל הגרגר הוא כ- 3 מ"מ, להארכת האשכול ולהגדלת גודל הגרגר. 4. בשלב ההבחלה (אופציונאלי), כאשר הפרי מתחיל להחליף צבע. עם היישום האחרון אנו מכוונים לשלוט בהתיישנות ולחזק את הבריקס.

לענבי מאכל
השתמש 5 פעמים עם 50 מ"ל/100 ליטר מים או 50 מ"ל לדונם.
יישום: 1. עם הצימוח החדש כאשר השריגים באורך של 5-10 ס"מ. באמצעות יישום זה אנחנו מקבלים צימוח אחיד ומוקדם יותר וכרם חזק ומוכן יותר לתקופת הפריחה. 2. עם התחלת הפריחה כאשר 2-3% מהפרחים פתוחים (אופציונאלי) או בפריחה מלאה. בשלב זה, היישום מחזק את הפרח לקראת ההאבקה. 3. אחרי החנטה כאשר גודל הגרגר הוא כ- 3 מ"מ, להארכת האשכול ולהגדלת גודל הגרגר. 4. במהלך התפתחות הפרי כאשר גודל הגרגר הוא כ- 5-10 מ"מ, להארכת האשכול ולהגדלת גודל הגרגר. 5. בשלב ההבחלה כאשר הפרי מתחיל להחליף צבע. עם היישום האחרון אנו מכוונים לשלוט בהתיישנות, לחזק את הבריקס ולהאריך את חיי המדף לאחר קטיף.

עגבנייה
השתמש עם 50 מ"ל/100 ליטר מים ליישום או 50 מ"ל לדונם.
יישום: 1. 10 ימים לאחר השתילה, לתמוך בצמיחה. 2. עם הופעת התפרחת הראשונה, להכנת הפריחה לחנטה מוצלחת. 3. עם הופעת התפרחת השנייה, להכין שוב את הפריחה לחנטה מוצלחת, אבל גם לשפר את הצימוח של העגבניות שכבר קיימות ואת ספיגת הסידן. באותה מתכונת להמשיך ליישומים הבאים עד להופעת התפרחת האחרונה בצמח. עם כל היישומים האלו אנחנו נקבל חנטה מוצלחת, חיזוק הצמח, הגדלת עובי הקליפה (שתייצר עמידות גדולה יותר של הפרי והארכת חיי המדף לאחר קטיף), חיזוק הבריקס והקטנת הנוזלים בפלצנטה על ידי המרתם לחומר מוצק ושיפור הצבע. הגדלנו את הגודל, אבל אם היישום יתבצע כמתואר גם היבול יגדל בצורה משמעותית.

קישוא-מלון-אבטיח-מלפפון-חציל-פלפל
השתמש עם 50 מ"ל/100 ליטר מים ליישום או 50 מ"ל לדונם.
יישום: 1. אחרי השתילה, להתאוששות מהלחץ של השתילה ולתמיכה בגדילת הצמח. 2. עם הופעת התפרחת הראשונה, להכנת הפריחה לחנטה מוצלחת. 3. עם הופעת התפרחת השנייה, להכין שוב את הפריחה לחנטה מוצלחת, אבל גם לשפר את הצימוח של הפירות הקיימים ואת ספיגת הסידן. אנחנו מכוונים לתמוך בחנטה ובהתפתחות הפרי תחת תנאים קשים (מזג אוויר חם). היישומים הבאים נעשים לפי הצורך לתפרחות הבאות ועד 20 יום לפני קטיף אחרון.

תפוח אדמה
יישם עם 80-50 מ"ל/100 ליטר מים ליישום (80-50 מ"ל לדונם). התחל כאשר הצמחים הם בגובה 20 ס"מ ובעת היווצרות הפקעות (פריחה) על מנת להגדיל את תפוחי האדמה.

תות שדה
יישם עם 50 מ"ל/100 ליטר מים (50 מ"ל לדונם) במהלך השלב הוגטטיבי כל 15 יום והמשך במהלך הפריחה לחנטה מוצלחת (לתותים בתצורה שיווקית אופטימלית). היישומים מסייעים לשיפור התפתחות הפירות וספיגת סידן מיטבית.

שעועית
יישם 4 פעמים עם 50 מ"ל/100 ליטר מים (50 מ"ל לדונם) כל 10 יום החל מהשלב בו יש 5-6 עלים. זה ישפר את הפריחה, החנטה ומספר הפירות ויאריך את חיי המדף אחרי קטיף.

ארטישוק
יישם 4-3 פעמים עם 50 מ"ל/100 ליטר מים (50 מ"ל לדונם) החל מהשינוי הראשון בראש. המטרה שלנו היא לקבל ראשים גדולים יותר ובמקביל לחזק את הצבע והדחיסות של הארטישוק. בסוף, אנחנו מקבלים שיפור בסגירות של הארטישוק והארכת חיי המדף לאחר קטיף.

כותנה
יישם עם 50-25 מ"ל/100ליטר מים ליישום או 50-25 מ"ל לדונם. יישם במהלך שלב הפריחה – מסוף יוני עד סוף יולי, עם יישום אחד ו- 15 ימים לאחר מכן יישום שני.

שילובים: ניתן לשלב עם כל חומרי ההדברה הרגילים פרט לנחושת.

הערות:
- ריסוס במהלך הפריחה צריך להתבצע בשעות אחה"צ המאוחרות כאשר הדבורים **אינן** נוכחות.
- המינונים המומלצים הם אינדיקטיוויים ויכולים להשתנות בהתאם לטמפרטורה וקרינת השמש.
- ביישום על העלים השתמש במינון המינימלי כאשר הטמפרטורה וקרינת השמש גבוהים.

משווק ע"י:

BioYOME
With You from the Root to the Fruit

ביו יום בע"מ
קיבוץ אייל, ד.נ. השרון התיכון 45840
טל: 072-2223280, פקס: 072-2223290
www.bioyome.com