



חומרי הדנה

5  
ליטר

תכשיר מרוכז לתיקון עלוותי של מחסורי אבץ, הגמעה ועיטוי זרעים

מכיל: 70% אבץ (ג/ל')

קרא בעיון את התווית לפני השימוש!

**נער היטב את מכל התכשיר לפני השימוש!**

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד!  
ليس للاستعمال المنزلي - للاستعمال الزراعي فقط

מס' הייצור ותאריך ייצור מופיעים על גבי האריזה.  
מיוצר ע"י חברת Agrichem - Australia  
משווק ע"י ביו-יום, צור יגאל  
עדכון תווית: 8/2022

# אקטיביסט מקס

אבץ 70%, 0-0-0-7 - N-P-K-S

אבץ מהווה חלק מאנזים המייצר פחמן דו חמצני (CO<sub>2</sub>), ושומר על רמתו עבור תהליך הפוטוסינתזה. אבץ חיוני גם לייצור אוקסין (הורמון), המסייע בוויסות הגדילה והתארכות הגבעולים. הוא משמש ליצירת הכלורופיל, הפיכת עמילנים לסוכרים ונכוחות ברקמת הצמח עוזרת לצמח לעמוד בטמפרטורות טמפרטורות קיצוניות. הניידות המוגבלת של האבץ עלולה ליצור מחסורים בצמח.

טכנולוגיית Activist® של Agrichem מספקת ספיגה מהירה של אבץ בעלים, ואחריה 4-6 שבועות של ספיגה מבוקרת. פורמולציה ייחודית המבטיחה כיסוי אחיד וספיגה יעילה בצמח.

# Activist Max

**BioYOME**  
With You from the Root to the Fruit

 agrichem®

 AUSTRALIAN MADE

## הוראות שימוש

**אזהרות:** התכשיר מסוכן בבליעה.

**אמצעי זהירות ומיגון:** יש ללבוש בגדי עבודה ארוכים עליהם סרבל עמיד לכימיקלים, נעלי עבודה סגורות וכובע לכיסוי ולהגנה על השיער. לבש כפפות ניטריל או PVC (לפי תקן EN-374/3). הרכב משקיף מגן עם אטימה מהצד (לפי תקן EN-166), אל תאכל או תשתה בזמן העבודה, אל תעשן בזמן העבודה. הימנע מבליעת ושאיפת התכשיר או התרסיס וממגע ישיר בעור ובעיניים.

**הכנת התרסיס:** מלא את מכל המרסס עד מחציתו במים. ערבב בצד את הכמות הדרושה של אקטיביסט מקס עם כמות מעטה של מים עד קבלת תמיסה אחידה. הוסף את התמיסה שהכנת לתוך מכל המרסס תוך כדי בחישה והשלם את כמות המים החסרה. יש להמשיך להפעיל את מערכת הערבול עד תום הריסוס.

**כללי:** אין לרסס בתנאי מזג אויר קיצוניים כגון קרה או שרב, או כאשר הגידול נמצא בתנאי עקה כגון יובש, חום או סובל מנזקי קרה.

## אופן היישום:

הגידול	ריסוס עלוותי המינין (סמ"ק/ד" או הריכוז (%))	הגמעה (סמ"ק/ד")	הערות
אבוקדו, בננה, הדרים, מנגו	0.025%-0.05%	100-200	יישום באביב, במהלך הגידול ולאחר קטיף
שקד, אפרסק, נקטרינה, דובדבן, משמש, שזיף	0.025%-0.05%	100-200	יישום בפצע רוד, לאחר חנטה ולאחר קטיף לפני נשירת העלים, אין ליישם בזמן הפריחה. יישום לאחר קטיף, לפני שלכת, בריכוז 0.2%
תפוח, אגס	0.025%-0.05%	100-200	
ענבנייה, מלפפון, פלפל, חציל, קישוא, אבטיח. מלון, תות שדה	0.025%-0.075%	100-200	יישום שלושה שבועות לאחר שתילה במווחים של 2-3 שבועות עד 14 יום לפני קטיף
כרוב, כרובית, ברוקולי, חסה, ביזל, תבלינים	25-75	100-200	ב 3-4 עלים אמיתיים
גזר, תפוא"א, בצל, סלק, בטטה	25-75	100-200	בתחילת העונה, כשיש מספיק עלווה לקלוט את התכשיר
גפן	0.025%-0.075%	100-200	1. כשהשריגים באורך 10 ס"מ 2. 5% פריחה
כותנה, חיטה, תירס, חימצה	25-200	60-200	ב 3-4 עלים אמיתיים*

\* אקטיביסט מקס יכול לתקן השפעות לא רצויות של קוטלי עשבי ממשפחת הסולפוניל-אוריה וקוטלי עשבים אחרים.

**שילובים:** יש לבצע בדיקת בטיחות מקדימה לפני שילוב אקטיביסט מקס בתכשירי הדברה והזנה אחרים.

## עיתוי זרעים

הגידול	המינין ל/טון זרעים
חיטה, שעורה, כותנה	2-6

## זרזה ראשונה:

אם חדר חומר לעיניים - שטוף אותן בזרם מים חלש במשך 15 דקות ופנה לרופא.

במקרה של בליעה פנה את הנפגע לרופא והצג בפניו תויות זו.

במקרה של מגע בעור או בחלקי גוף חשופים יש לשטוף במים ובסבון ואחר כך במים זורמים במשך 15 דקות.

## מידע לרופא:

מספר הטלפון של המרכז הארצי למידע בהרעלות בבית חולים רמב"ם: 04-7771900

**תנאי מכירה:** היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים ביעילותו, אולם היות שאין באפשרותם לפקח על אופן השימוש בתכשיר והתנאים בעת השימוש בו, אין הם אחראים לכלל התוצאות והנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה, הן לפי ההוראות