# מקס® זרחן

N-P-K-S – 9-12-2-0 + Zn + Organic acids

חומרי הזנה

5
ליטר

## תכשיר אידאלי כסטרטר בהגמעה ולריסוס עלוותי כאשר נדרשות רמות גבוהות של זרחן וחנקן בזמינות מיידית לצמיחה וייצור שורשים

צמחים זקוקים לזרחן יציב וזמין בכל שלבי הצמיחה, במיוחד בשלבי הצמיחה המוקדמים שכן הזרחן הכרחי לחלוקת התאים ולצמיחה. למרות שהזרחן נייד בתוך הצמח, הוא יחסית אינו נייד בקרקע.
מקס זרחן מכיל פורמולציה ייחודית של זרחן ואבץ בשחרור מבוקר המבטיחה כיסוי אחיד וספיגה יעילה בצמח. השחרור המבוקר מבטיח אספקה יציבה לשורשים בקרקעות עם טווח pH רחב. האבץ והזרחן מסייעים בצמיחת השורשים.

**מכיל:**
חנקן 9.1%, זרחן 12%, אשלגן 2%, אבץ 1.5%

קרא בעיון את התווית לפני השימוש!

**נער היטב את מכל התכשיר לפני השימוש!**

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד!
ليس للاستعمال المنزلي - للاستعمال الزراعي فقط

מס' הייצור ותאריך ייצור מופיעים על גבי האריזה.
מיוצר ע"י חברת Agrichem - Australia
משווק ע"י ביו-יום, צור יגאל
עדכון תווית: 3/2024



# KEYSTONE PLUS

BioYOME
With You from the Root to the Fruit

agrichem

AUSTRALIAN MADE

מקס זרחן

**הוראות שימוש**

**אזהרות:** התכשיר מסוכן בבליעה.

**אמצעי זהירות ומיגון:** יש ללבוש בגדי עבודה ארוכים עליהם סרבל עמיד לכימיקלים, נעלי עבודה סגורות וכובע לכיסוי ולהגנה על השיער. לבש כפפות ניטריל או PVC (לפי תקן EN-374/3) .הרכב משקפי מגן עם אטימה מהצד (לפי תקן EN-166) , אל תאכל או תשתה בזמן העבודה, אל תעשן בזמן העבודה. הימנע מבליעת ושאיפת התכשיר או התרסיס וממגע ישיר בעור ובעיניים.

**הכנת התרסיס:** מלא את מכל המרסס עד מחציתו במים. ערבב בצד את הכמות הדרושה של מקס אלמנטס עם כמות מעטה של מים עד קבלת תמיסה אחידה. הוסף את התמיסה שהכנת לתוך מכל המרסס תוך כדי בחישה והשלם את כמות המים החסרה. יש להמשיך להפעיל את מערכת הערבול עד תום הריסוס.

**כללי:** אין לרסס בתנאי מזג אויר קיצוניים כגון קרה או שרב, או כאשר הגידול נמצא בתנאי עקה כגון יובש, חום או סובל מנזקי קרה.

**אופן היישום:**

| הגידול | ריסוס עלוותי - המינון (סמ"ק/ד') או הריכוז (%) | הגמעה - המינון (סמ"ק/ד') | הערות |
|---|---|---|---|
| אבוקדו, בננה, הדרים, מנגו, רימון | 0.5% | 1000-1500 | שני יישומים, יישום באביב ויישום אחרי קטיף |
| שקד, אפרסק, נקטרינה, דובדבן, משמש, שזיף | 0.5% | 750-1500 | **אין לרסס ריסוס עלוותי במהלך עונת הגידול**, יישום בפקע ורוד ולאחר קטיף לפני השלכת |
| תפוח, אגס | 0.5% | 1000-1500 | |
| עגבנייה, מלפפון, פלפל, חציל, קישוא, אבטיח. מלון, תות שדה | 0.5% | 500-600 | יישום 3 שבועות לאחר שתילה, המשך במרווחים של 2-3 שבועות לפי הצורך |
| כרוב, כרובית, ברוקולי, חסה, בזיל, תבלינים | 250-400 | 500-700 | 1.שבועיים לאחר שתילה<br>2.שבועיים לאחר מכן |
| גזר, תפו"א, בצל, סלק, בטטה | 250-400 | 500-1000 | 1.שבוע לאחר 100% הצצה<br>2.שבועיים לאחר מכן |
| גפן | 0.5% | 250-500 | 1.כשהשריגים באורך 10 ס"מ<br>2. 5% בפריחה |
| כותנה, חיטה, תירס, חימצה | 100-200 | 200-500 | בעלה חמישי |

**שילובים:** יש לבצע בדיקת בטיחות מקדימה לפני שילוב מקס זרחן בתכשירי הדברה והזנה אחרים.

**עזרה ראשונה:**
אם חדר חומר לעיניים - שטוף אותן בזרם מים חלש במשך 15 דקות ופנה לרופא.
במקרה של בליעה פנה את הנפגע לרופא והצג בפניו תווית זו.
במקרה של מגע בעור או בחלקי גוף חשופים יש לשטוף במים ובסבון ואחר כך במים זורמים במשך 15 דקות.

**מידע לרופא:** מספר הטלפון של המרכז הארצי למידע בהרעלות בבית חולים רמב"ם: **04-7771900**

**תנאי מכירה:** היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים ביעילותו, אולם היות שאין באפשרותם לפקח על אופן השימוש בתכשיר והתנאים בעת השימוש בו, אין הם אחראים לכל התוצאות והנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה, הן לפי ההוראות

AUSTRALIAN MADE

agrichem

BioYOME
With You from the Root to the Fruit